

④年齢別報告件数

年齢	コヒナティ筋注					スパイクバックス筋注					パキセブリア筋注				
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
0～4歳	-	1	-	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-
5～9歳	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-
10～14歳	4,111,578	272	0.01%	2	0.00%	231,522	22	0.01%	0	0.00%	10	0	0.00%	0	0.00%
15～19歳	7,577,505	583	0.01%	1	0.00%	1,587,302	242	0.02%	1	0.00%	80	0	0.00%	0	0.00%
20～24歳	6,141,173	832	0.01%	4	0.00%	3,985,795	442	0.01%	5	0.00%	307	0	0.00%	0	0.00%
25～29歳	6,929,588	1,056	0.02%	18	0.00%	3,445,861	262	0.01%	5	0.00%	427	1	0.23%	0	0.00%
30～34歳	7,615,058	905	0.01%	10	0.00%	3,199,127	223	0.01%	6	0.00%	504	0	0.00%	0	0.00%
35～39歳	9,017,551	1,176	0.01%	12	0.00%	3,328,624	195	0.01%	2	0.00%	623	1	0.16%	0	0.00%
40～44歳	10,674,659	1,313	0.01%	12	0.00%	3,368,995	162	0.00%	8	0.00%	23,957	1	0.00%	0	0.00%
45～49歳	13,146,110	1,402	0.01%	27	0.00%	3,850,432	189	0.00%	5	0.00%	31,235	5	0.02%	0	0.00%
50～54歳	13,245,359	1,216	0.01%	37	0.00%	3,419,681	151	0.00%	10	0.00%	25,605	1	0.00%	0	0.00%
55～59歳	11,575,693	943	0.01%	35	0.00%	2,543,562	104	0.00%	8	0.00%	16,782	3	0.02%	1	0.01%
60～64歳	12,064,885	715	0.01%	39	0.00%	1,510,076	52	0.00%	3	0.00%	9,555	1	0.01%	0	0.00%
65～69歳	13,697,554	888	0.01%	77	0.00%	828,887	57	0.01%	2	0.00%	2,505	0	0.00%	0	0.00%
70～74歳	17,383,480	1,023	0.01%	140	0.00%	668,993	40	0.01%	1	0.00%	1,997	1	0.05%	0	0.00%
75～79歳	12,450,637	944	0.01%	156	0.00%	235,786	6	0.00%	1	0.00%	930	0	0.00%	0	0.00%
80歳以上	22,565,675	2,537	0.01%	701	0.00%	189,406	18	0.01%	4	0.00%	924	0	0.00%	0	0.00%
不明	99,724	1,290	1.29%	27	0.03%	41,225	150	0.36%	4	0	62	0	0.00%	0	0.00%
(参考) 65歳以上	66,097,346	5,570	0.01%	1,084	0.00%	1,923,069	127	0.01%	8	0.00%	6,355	1	0.02%	0	0.00%

※接種開始日（コヒナティ筋注：令和3年2月17日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、パキセブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※年齢は発症時点の年齢。

※コヒナティ筋注の接種対象者は12歳以上。スパイクバックス筋注の接種対象者は12歳以上。パキセブリア筋注の接種対象者は、必要がある場合を除き、40歳以上。推定接種者数は、全てのワクチンで「10～14歳」以降の階級の接種者数を表示。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※65歳以上には「高齢者」として報告された症例を含む。また、年齢を「小児」として報告された症例は「10～14歳」に集計。

※年齢・性別別の推定接種回数は、1/2接種分までのデータについて、首相官邸Webサイト（1/6時点掲載データ参照）の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。性別が不明又はその他とされたものは、「不明」として処理。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

注：コヒナティ筋注の不明には、母親がワクチン接種を受けた胎児、新生児、乳幼児の症例の13件を含む。また、「0～4歳」に集計された1件は、本剤の接種を受けた母親が同日授乳を実施、授乳約2時間後に新生児において発熱、下痢、嘔吐の症状が発現した症例。